

ارگانیک (چه به صورت منظم یا متناوب) تا ۴۸ ساعت بعد از مصرف این داروها ممنوع است.

ت-ملاحظات مصرف نیترویاف در دوران بارداری و شیردهی چیست؟ مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تأثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی‌باشد، منافع و مضار احتمالی ناشی از استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

ت- مواردی را که قبل از مصرف نیترویاف باید به پزشک خود اطلاع دهید چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی و کبدی هستید،
- اگر مبتلا به کم خونی شدید می‌باشید،
- اگر دچار ضربه اخیر به سر و خونریزی مغزی شده‌اید،
- اگر مبتلا به گلوکوم (افزایش فشار داخلی چشم) می‌باشید،
- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
- اگر در دوران شیردهی هستید،
- و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با نیترویاف، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- داروهای پایین آورنده فشارخون و یا داروهای گشادکننده عروق،
- داروهای مهارکننده آنزیم فسفودی‌استراز ۵ مانند سیلدنافیل و تادالافیل،
- هپارین، دی‌هیدروارگوتامین،
- مصرف فرآورده‌های حاوی الکل.

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظر تان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- نیترویاف چگونه اثر می‌کند؟

نیترویاف دارای ماده موثره نیتروگلیسرین است؛ که با متعادل کردن حجم خون وارد شده به قلب باعث کاهش اکسیژن مورد نیاز عضله قلبی می‌گردد و همچنین از طریق گشاد کردن عروق به ویژه وریدها و توزیع مجدد و مؤثرتر جریان خون در قلب، میزان اکسیژن‌رسانی به قلب را افزایش داده و نسبت متعادلی از نیاز به اکسیژن و عملکرد قلبی ایجاد می‌کند.

ب- نیترویاف در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

اسپری نیترویاف جهت تسکین فوری درد ناشی از حملات آنژین صدری و نارسایی بطن چپ، و یا به منظور پیشگیری از شروع این حملات بلافاصله پیش از شرایط ایجاد کننده آن مانند فعالیت فیزیکی و استرس تجویز می‌شود.

پ- نکاتی که باید قبل از مصرف نیترویاف به آنها توجه نمود:

در چه مواردی از مصرف نیترویاف باید خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی نیتروگلیسرین و سایر نیترات‌ها از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

- مصرف این دارو به استثناء شرایط خاص همزمان در بیماران مبتلا به کم خونی شدید، افزایش فشار داخل جمجمه‌ای (خونریزی مغزی و یا آسیب به سر)، گلوکوم (افزایش فشار داخلی چشم)، افت فشار خون وضعیتی، نارسایی شدید کبدی، هیپرتیروئیدی، انفارکتوس حاد قلبی (شروع حمله قلبی)، بیماران مبتلا به تامپوناد قلبی (فشرده‌گی قلب ناشی از تجمع خون یا مایع در فضای بین ماهیچه و پوشش بیرونی دور قلب) و یا پریکاردیت قلبی (اختلال در کیسه دور قلب)، نارسایی شدید کلیوی، پرتحرکی دستگاه گوارش، سندرم سوء جذب و همچنین مصرف همزمان با داروهای موثر در ناتوانی جنسی نظیر سیلدنافیل و تادالافیل منع مصرف دارد.

توجه: مصرف داروهای موثر در ناتوانی جنسی نظیر سیلدنافیل و تادالافیل در بیماران مصرف کننده نیتروگلیسرین و سایر نیترات‌های

Nitropuff

Nitroglycerin
Spray Solution (Sublingual) 400 mcg/Puff

- پیش از مصرف این دارو بهتر است در حالت نشسته باشید.
- از تکان دادن اسپری پیش از مصرف خودداری نمایید.
- از مصرف دارو برای طولانی مدت خودداری نمایید.
- همواره اسپری خود را به همراه داشته باشید.
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی نیتروپاف چیست؟
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:
شیوع کم: تاری دید، خشکی دهان، سردرد شدید و طولانی، راش‌های پوستی.
۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: گرگرفتگی صورت و گردن (وابسته به دوز)، سردرد، تهوع و استفراغ، افت فشار خون وضعیتی (احساس عدم تعادل و سبکی سر به ویژه هنگام تغییر وضعیت از حالت خوابیده یا نشسته به ایستاده)، بی‌قراری، افزایش ضربان قلب.

خ- مشخصات دارو:
- هر جعبه داروی نیتروپاف، حاوی ۱ عدد اسپری زیرزبانی نیتروگلیسرین ۴۰۰ mcg/puff (محتوی ۱۰۰ پاف)، به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری نیتروپاف چیست؟
- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از یخ زدگی دارو جلوگیری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از اسپری کردن دارو در مجاورت شعله آتش خودداری نمایید.
- دارو را به صورت ایستاده نگهداری نمایید.

www.dorsadarou.com
customerservice@dorsadarou.com
Des.Lef.Nitpu/00.04/00

سایت اینترنتی:
رایانامه جهت ارتباط مشتری:

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول نیتروپاف چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

پیشگیری و تسکین فوری درد قفسه سینه ناشی از آنژین صدری:
بزرگسالان: یک تا دو پاف زیر یا روی زبان اسپری کنید، سپس دهان را بسته نگه داشته و از استنشاق آن خودداری نمایید.

توجه: در صورت عدم بهبودی درد قفسه سینه، مصرف این دارو با فاصله زمانی حداقل ۵ دقیقه تا سه نوبت قابل تکرار است. در صورت عدم تسکین درد پس از مصرف سه نوبت به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

توجه: از کمترین دوز لازم به منظور تسکین علائم آنژین خود استفاده نمایید. مصرف مقادیر بیش از مورد نیاز این دارو موجب بروز تحمل دارویی در بیمار و کاهش اثر بخشی آن می‌گردد.

توجه: حداکثر مقدار تجویزی در بزرگسالان ۱۲۰۰ میکروگرم در روز (حداکثر ۳ پاف در روز) می‌باشد.

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف نیتروپاف چیست؟
- پیش از استفاده از بطری جدید نیتروپاف و یا بطری که بیش از یک هفته از آن استفاده نشده است باید تکمه اسپری را محکم فشار داده و اولین پاف را به سمت هوا اسپری نمایید تا پمپ اسپری آماده به کار شود (شکل ۱). سپس بطری را به حالت عمودی و رو به بالا در جلوی دهان گرفته و به سمت زیر یا روی زبان اسپری نمایید (شکل ۲). پس از اسپری دهان را بسته نگه داشته و چند لحظه نفس خود را حبس کنید. برای پاف بعدی ۳۰ ثانیه بعد اقدام نمایید.

