

## پروپرانولول

قرص روکشدار خطدار ۲۰، ۱۰ و ۴۰ میلی گرمی

آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

ث- مواردی را که قبل از مصرف پروپرانولول باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر سابقه آنافیلاکسی به آلرژن‌ها را دارد،

- اگر مبتلا به برونکوسیپسیم (آسم) می‌باشد،

- اگر مبتلا به دیابت قندی می‌باشد،

- اگر مبتلا به افسردگی روانی هستید،

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی، قلبی و کلیوی می‌باشد،

- اگر مبتلا به میاستنی گراویس هستید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می‌باشد،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با پروپرانولول، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون سخنه و به ویژه مواردی که در زیرآمد است حتیاً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- سایمیدیدین

- فنوباربیتال

- وراپامیل یا دیلتیازم

- رزپین

- ایزوپروترنول

- ایزوکاربوکسازید و سلژیلین

- توبوکوارین

- آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم

- هیدرالازین

- لیدوکائین

- فوتیازین‌ها (کلرپرومازین، تیوریدازین)

- کوکائین و گاباپنتین

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

ج- مقدار مصرف معمول پروپرانولول چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- بزرگسالان:

- به عنوان خصیه آریتمی: ۱۰-۳۰ میلی گرم سه تا چهار بار در روز

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی پروپرانولول چگونه اثر می‌کند؟

- پروپرانولول به طور غیر انتخابی گیرنده‌های بتا (β1 و β2) موجود در عضلات قلب، عروق محیطی، برونش، پانکراس و کبد را مسدود کرده و موجب کاهش تعداد ضربات قلب و کاهش فشار خون می‌شود.

ب- داروی پروپرانولول در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- کاهنده فشار خون، کنترل آنژن صدری، درمان تیروتوکسیکوز، به عنوان ضد آریتمی فوق بطئی، جلوگیری از بروز میگرن یا سردرد عروقی، کاهش مرگ و میر بعد از انفارکتوس میوکارد، درمان کمکی اضطراب، لرزش‌های حرکتی اولیه یا ناشی از پییری تجویز می‌شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی پروپرانولول به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف پروپرانولول خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی پروپرانولول و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن و همچنین شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک درجه دو و یا سه دهلیزی-بطئی، برادیکاردی سینوسی و کاهش فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف پروپرانولول در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف



# Propranolol

## F.C. Scored Tablets 10, 20 & 40mg

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟  
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟  
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایع‌ترین عوارض دارویی پروپرانولول چیست؟

هر دارو به موزات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عارض زیر یا هرگونه عارضهای که در این برگه راهنمای ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

برادیکاردی (کاهش ضربان قلب)، کاهش فشارخون، نارسایی قلبی، حملات شدید آسم در مبتلایان به بیماری مجاری هوایی، تهوع و استفراغ، اسهال، ناتوانی جنسی، سرگیجه، بی‌حسی یا گزگز کردن انگشتان دست و پا و ضعف غیر عادی، اشکال در تنفس و خس خس کردن.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد قرص روکشدار خط دار پروپرانولول ۱۰ یا ۲۰ و یا ۴۰ میلی‌گرمی (۱۰ بیلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری پروپرانولول چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.  
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.  
- از مصرف داروهایی که بیلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

Des.Lef.Pro/96.04/00

(قبل از غذا و هنگام خواب) تجویز می‌گردد.

- به عنوان کاهنده فشارخون: شروع درمان با مقدار اولیه ۴۰ میلی‌گرم دو بار در روز و یا ۸۰ میلی‌گرم (شکل پیوسته‌رهش) یکبار در روز آغاز می‌شود و درمان نگهدارنده با مقدار ۱۲۰-۲۴۰ میلی‌گرم در روز در دو یا سه نوبت منقسم و یا ۸۰-۱۶۰ میلی‌گرم (شکل پیوسته‌رهش) یکبار در روز ادامه پیدا می‌کند. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۶۴۰ میلی‌گرم می‌باشد.

- درمان آنژین صدری: شروع درمان با مقدار اولیه ۸۰ میلی‌گرم (شکل پیوسته‌رهش) یکبار در روز آغاز می‌شود و درمان نگهدارنده با مقدار ۸۰-۳۲۰ میلی‌گرم در دو تا چهار نوبت منقسم و یا ۱۶۰ میلی‌گرم (شکل پیوسته‌رهش) یکبار در روز ادامه پیدا می‌کند. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۳۲۰ میلی‌گرم می‌باشد.

- درمان انفارکتوس میوکارد: روزانه مقدار ۱۸۰-۲۴۰ میلی‌گرم در دو یا سه نوبت منقسم تجویز می‌گردد. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۲۴۰ میلی‌گرم می‌باشد.

- درمان تنکی ناشی از هیپرتروفی زیرآئورت: ۲۰-۴۰ میلی‌گرم سه تا چهار بار در روز تجویز می‌گردد.

- درمان کمکی در فنوکروموسیتوم: روزانه مقدار ۶۰ میلی‌گرم در چند نوبت منقسم سه روز قبل از عمل جراحی تجویز می‌گردد.

- در درمان سردردهای عروقی: ۸۰-۲۴۰ میلی‌گرم در چند نوبت منقسم تجویز می‌گردد.

- به عنوان خداحضراب و کاهش علائم آن نظیر طیش قلب، تعریق و لرزش: ۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد. در صورت نیاز می‌توان تا حداکثر ۴۰ میلی‌گرم سه بار در روز نیز تجویز نمود.

- کودکان:

- به عنوان خدآریتمی و کاهنده فشارخون

شروع درمان با مقدار یک میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار در یک روز محاسبه می‌شود. در صورت نیاز، افزایش مقدار تجویزی در فواصل ۳-۵ روزه انجام می‌گیرد. حداکثر مقدار مصرف در یک روز ۱۶ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار در چند نوبت منقسم می‌باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف پروپرانولول چیست؟

- این دارو را باید به همراه غذا یا بلافضله بعد از غذا میل نمایید.

- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و گیجی، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید با احتیاط مصرف شود.



[www.dorsapharma.com](http://www.dorsapharma.com)



dorsadarou



021- 54612000



تهران- طرشت- محله تیموری- بلوار شهید صالحی  
نبش سه راه اکبری- برج فناوری شریف- طبقه هشتم