

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - محلول خوراکی درسونیت چگونه اثر می کند؟

- آلندرونیت از دسته داروهای بیس فسفونات ها می باشد که با اثر برگرویی از سلول های استخوانی (استئوکلاست ها یا پیش سازهای استئوکلاست) موجب کاهش سرعت تجزیه استخوان و یا مانع از تجزیه آن می شود و در نتیجه به طور غیر مستقیم تراکم استخوانی را افزایش می دهد.

ب - محلول خوراکی درسونیت در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درسونیت (آلندرونیت) جهت درمان و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه، درمان افزایش توده استخوانی در مردان مبتلا به پوکی استخوان و درمان بیماری پاژه استخوان در مردان و زنان تجویز می شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف محلول خوراکی درسونیت به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف محلول خوراکی درسونیت خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی آلندرونیت و یا سایر اجزای متشکله دارو؛

- مصرف این دارو همزمان در بیماران مبتلا به اختلالات مری (مانند سختی در بلع یا درد هنگام بلع، سوزش سردل)، بیمارانی که مشکل کلیوی دارند، افرادی که عدم توانایی ایستادن یا قرار گرفتن در حالت نشسته به مدت ۳۰ دقیقه

دارند، افرادی که سطح کلسیم در خون آنها پایین می باشد و همچنین زنانی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند، منع مصرف دارد.

ت - ملاحظات مصرف محلول خوراکی درسونیت در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

از مصرف دارو در دوران بارداری خودداری نمایید.

- مصرف در شیردهی:

از مصرف دارو در دوران شیردهی خودداری نمایید.

ث - مواردی را که قبل از مصرف محلول خوراکی درسونیت باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به خونریزی فعال گوارشی می باشید؛

- اگر دچار شکستگی استخوان ران می باشید؛

- اگر سابقه زخم و یا جراحی دستگاه گوارشی فوقانی در طی یک سال اخیر داشته اید؛

- اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید؛

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با محلول خوراکی درسونیت، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آسپرین و یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی؛

- مکمل های کلسیم، منیزیم، آهن و ضد اسیدها؛

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ - مقدار مصرف معمول محلول خوراکی درسونیت چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- درمان پوکی استخوان در بزرگسالان: یک بطری به طور کامل (حاوی ۷۰ میلی گرم آلدرونیت در ۷۵ میلی لیتر)، یکبار در هفته تجویز می‌گردد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف محلول خوراکی درسونیت چیست؟

- محتویات بطری رو به طور کامل میل نموده و بلافاصله پس از آن حداقل ۶۰ میلی لیتر (یک چهارم لیوان) آب مجدداً بنوشید.

توجه: از نوشیدن دارو با آب معدنی، آب میوه، قهوه و چای خودداری نمایید.

- دارو را صبح‌ها نیم ساعت قبل از صبحانه و با معده خالی میل نمایید.

- دارو را در حالت نشسته و ایستاده میل کرده و پس از مصرف آن تا نیم ساعت از دراز کشیدن خودداری نمایید.

- دارو را فقط یک بار در هفته و در یک روز مشخص مصرف نمایید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً

به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهمترین و شایعترین عوارض دارویی محلول خوراکی درسونیت چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

شایع: اختلالات دستگاه گوارش، متورم شدن مفاصل، سرگیجه؛

شیوع کم: خونریزی غیر معمول؛

نادر: شکستگی استخوان ران (درد، ضعف یا ناراحتی در ناحیه لگن)، حساسیت به نور و واکنش پوستی شدید (خارش، قرمزی، متورم شدن، تاول و یا لایه برداری پوست).

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه محلول خوراکی درسونیت حاوی ۷۰ میلی گرم آلدرونیت در ۷۵ میلی لیتر به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د - شرایط نگهداری محلول خوراکی درسونیت چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.