


360°  
lipid  
& Cholesterol  
Control

GET  
DOWN WITH  
**Rousana®**



# Rousana®

Rosuvastatin 5,10,20,40mg



GMP  
ISO 9001 - 2008  
EN ISO 13485 - 2003  
EN ISO 14001 - 2004



دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پژوهیه تدبیس سینمایی  
دوچشمیا در فیلم صنعت لامت محور

# دو زانا®

روز و راستا تین (قرص روکش دار، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم)

مکانیسم اثر:

قرص روزانه<sup>®</sup> با مهار آنزیم اصلی سازنده اولیه کلسترول در بدن، موجب کاهش تولید کلسترول می‌گردد.

موارد مصرف:

- درمان کمکی همراه رژیم غذایی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید خون در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه

- درمان اولیه و یا کمکی جهت کاهش کلسترول تام خون در بیماران مبتلا به انواع هایپرکلسترولمی فامیلیال

- پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی

موارد منع مصرف:

هرگونه حساسیت نسبت به داروی روز و راستا تین، مبتلا بودن به بیماری فعلی کبدی و یا افزایش بدون توضیح آنژیم‌های کبدی، بارداری و شیردهی

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است (گروه X) و در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

تداخلات دارویی:

آمیڈورون، دیگوکسین، دیلیتام، وراپامیل، جمیفیروزیل، نیاسین، آنتی‌اسیدها، سایمتیدین، رانیتیدین، کلستیرامین، خصدقارچ‌های آزوی، آنتی‌بیوتیک‌های ماقرولیدی، سیکلوسپورین، خبدیارهای خوش‌بوی

مقدار مصرف:

- در درمان بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه (شامل هتروزیگوت فامیلیال و غیر فامیلیال) و دیس‌لیپیدمی مختلط محدوده تجویز ۵ تا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد. میزان دوز نگهدارنده در یافتن برآسانس نیاز بیمار و پاسخ‌های درمانی در طی یک دوره ۲-۴ هفته‌ای توسط پزشک تنظیم می‌گردد. حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

- در درمان هایپرکلسترولمی فامیلیال دوز تجویزی ۳۰ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

- در پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی ۲۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می‌گردد. در سالمندان بالای ۷۰ سال، بیماران نیاز داشتر شرق آسیا و یا بیماران مستعد میوپاتی مقدار دوز شروع ۵ میلی گرم یک بار در روز نیاز باشند. میزان دوز شروع ۲۰ میلی گرم یک بار در روز افزایش پیدا می‌کند. حداکثر مقدار تجویزی ۲۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

- در صورت مصرف هم زمان با سیکلوسپورین حداکثر مقدار تجویزی ۵ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد.

- در صورت مصرف هم زمان با فیربرات‌ها حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد.

- در بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه) مقدار دوز شروع ۵ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی گرم یک بار در روز می‌باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو در کودکان زیر ۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نحوه صحیح مصرف:

- در دوران مصرف این دارو، از الکل و آب گربه فروت استفاده نشود و دوره درمان کامل شود.

- این دارو را بدون در نظر گرفتن وضعه غذایی به صورت تک دوز و در یک زمان معین مصرف نمایند.

- در صورت فراهمش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن مصرف شود، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری گردد.

عواصر دارویی:

هر دارو به موازی اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض ذکر شده یا هرگونه عارضه دیگر با پزشک یا دکتر دارو ساز مشورت شود: سردرد، اسهال، تهوع، سرگیجه، ضعف عضلانی، درد و گرفتگی عضلات و بیوست.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳ عدد قرص روکش دار روزانه<sup>®</sup>، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی (سه بی‌سیتر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

## Reference:

Drug facts and comparisons 2016